

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

P 27-3-72 293579

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

25 F.

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, MAYENNE)

Poste 571

Régisseur de recettes de la D.D.A. - Protection des Végétaux - Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

SUPPLEMENT-N° 3 AU BULLETIN N° 138 DE MARS 1972 - TOUS DEPARTEMENTS P 14

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les températures élevées de la dernière décade ont permis une végétation exceptionnellement rapide en même temps qu'elles ont accéléré la maturité des périthèces. Les poiriers vont atteindre un stade très sensible à la maladie. Des contaminations graves pourraient donc se produire lors de pluies. Par conséquent:

- dans les vergers des départements de Maine et Loire, de la Loire Atlantique (sauf le Nord) et de la Vendée, une nouvelle application doit être exécutée immédiatement, si depuis le dernier traitement, d'importantes surfaces végétales non protégées sont apparues (passage, fréquent sur de nombreuses variétés, du stade de la séparation des boutons floraux au stade de la pré-floraison). Par contre, si un traitement vient seulement d'être exécuté, son renouvellement pourra être repoussé de quelques jours en fonction de la rapidité de végétation.
- dans les vergers des départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Nord de la Loire Atlantique, la végétation est un peu plus tardive mais également rapide. La maturité des périthèces s'accélère. Par conséquent, le traitement conseillé dans la note du 17 Mars doit être terminé de toute urgence.

La période la plus dangereuse pour la tavelure est sur le point d'être atteinte et les arboriculteurs devront se méfier, si les températures actuelles se maintiennent, de la rapidité de végétation qui fait très rapidement apparaître des surfaces non protégées.

TAVELURE DU POMMIER - Les projections d'ascospores sont de plus en plus nombreuses et les variétés commerciales ont pratiquement toutes atteint un stade sensible à la maladie. En conséquence:

- dans les vergers des départements du Maine et Loire, de la Vendée, de la Loire Atlantique (sauf le Nord), il y a lieu de terminer très rapidement le traitement conseillé dans le bulletin du 17 Mars. Pour les variétés à débourrement très tardif, attendre que le stade C3 D soit atteint.
- dans les vergers des départements de la Sarthe, de la Mayenne et dans le Nord de la Loire Atlantique, les variétés commerciales sont sur le point d'atteindre le stade sensible C3 D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux). Un premier traitement devra donc être exécuté au fur et à mesure que ce stade sera atteint. Sur les variétés à débourrement très précoce, le traitement conseillé dans la note du 17 Mars doit être terminé immédiatement.

Comme pour la tavelure du poirier, les arboriculteurs doivent se méfier de la rapidité de la végétation, si les températures actuelles se maintiennent.

OIDIUM DU POMMIER - Il est rappelé que les premières conidies sont formées et que les conditions climatiques sont très favorables à cette affection. Sur les variétés sensibles, il est donc indispensable d'assurer la protection dès maintenant.

.... /

6

PUCERONS DU POIRIER - Dans la Vallée de la Loire, les premiers foyers sont apparus. Les arboriculteurs des départements du Maine et Loire, de la Loire Atlantique (sauf le Nord) et de la Vendée, auront donc intérêt à ajouter dès maintenant un produit aphicide à la bouillie anti-tavelure, compte tenu de la proximité de la floraison.

ARaignee ROUGE - Il est encore trop tôt pour intervenir.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Pays de Loire"

J. DIXMERAS

Les Ingénieurs Chargés des Avertissements Agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 22 Mars 1972